VHBC-Treffen Köln 5./6. November 2018

Wofür schlägt mein Herz?

Zu welchem Thema hat mich
meine Neugierde verführt - und
geführt?

Zu welchem Thema hat mich meine Neugierde verführt – und geführt?

Eine Frage, die mich bewegt, ist, wie kann es in professionellen Kontexten gelingen

- Perspektiven des Erkennens
- Perspektiven des Verstehens
- zu erweitern?

- Um „gelingende Beratung“ zu gestalten ist es auch notwendig, das Gegenüber in seinem „So-Geworden-Sein“ – auch mit seinem Kontext – zu verstehen
 - in Medizin und Psychotherapie wird dies auch „Diagnose“ genannt
 - nur – dort ist bereits die Diagnose durch eine evidenz- und Leitlinien orientierte Perspektive bereits jetzt sehr viel eingengter als in der Beratung

Beratung ist die Anwendung von

- Beratungs- und Interaktionswissen
- im Zusammenspiel
- mit handlungsfeldspezifischem Wissen

- Was erkenne ich für „gelingende Beratung neu“, wenn ich versuche, das Gegenüber in seinem So-Geworden-Sein zu verstehen?
- ... und wie könnte ein Konzept einer solchen Perspektive gestaltet sein, so zu schauen?

Eine mögliche Perspektive

Das ökosoziale Modell der Systemebenen

Eine *andere* mögliche Perspektive

Professionelle Perspektive

Kybernetik 1. Ordnung

→ die klassische Perspektive

Professionelle Perspektive

Kybernetik 2. Ordnung

Professionelle Perspektive

Kybernetik 2. Ordnung

Professionelle Perspektive

Kybernetik 2. Ordnung

Träger
Institution
Mitarbeitende

Klient
Patient
Familie

Professionelle Perspektive

Professionelle Perspektive

oder auch
Kybernetik 2.1. Ordnung

Träger
Institution
Mitarbeitende

- Wissenschaften
- Medizin
 - Medizingeschichte
 - Entwicklungspsychologie
 - Zeitgeschichte
 - Pharmakologie
 - pharmakologische Geschichte
 - Recht
 - Pränatale Psychologie
 - Theologie

Klient
Patient
Familie

→ Was erkennen wir „neu“,
wenn ich im Sinne
der **Kybernetik 2.1.**
das Gegenüber in seinem
So-Geworden-Sein verstehe?

→ Wie kann es gelingen, diese
Komplexität „zu verstehen“?

Zunächst eine Verortung der Perspektive

- ... Lebensentwicklung in seiner Komplexität anzuschauen
- ... versus
- ... Mikroblick auf eine Phase des Lebens

vorgeburtliche Entwicklung

Kindheit

Jugend

Erwachsene

Zygotenteilung

Embryonalzeit
3.-7. Woche

Fetalzeit
8. W. bis Geburt

Neugeborenes/
Säugling 0-12
Mon.

Kleinkind 1-3 Jahre
Kindheit 4-13 Jahre

Jugend 14-18 Jahre

Erwachsene 18-21 Jahre

Erwachsene
22-27 Jahre

Familiärer Lebenszyklus

Grundsätzlich ist eine „Verbindung“ zwischen vor- und nachgeburtlichem Leben herzustellen

Zeitreihe bis 18 Jahre

Grundsätzlich ist eine „Verbindung“ zwischen vor- und nachgeburtlichem Leben herzustellen

Zeitreihe bis 18 Jahre

Zeitreihe bis 18 Jahre

Defizite in Lern- und Leistungsfähigkeit
und der Bindungsfähigkeit

Individuelles Leben

Individuelles Leben + Eltern

Individuelles Leben + Eltern + Großeltern

Großeltern

„Was erkenne ich neu?“

Die Anwendung dieser
Perspektive in der Praxis der
Beratung

Die Anwendung der Kybernetik 1 + 2 + 2.1 in der Praxis

das Thema

→ (Pflege)Eltern fragen um Rat:

→ „Wir wissen nicht mehr weiter.

Wir verstehen nicht, warum sich unser Kind – 6 Jahre alt – so verhält?“

Timeline – A. (Familie K.)

Timeline – A. (Familie K.)

Timeline – A. (Familie K.)

Wissenschaft des Rechtes

Jugendhilferecht

§

- Professionelle Aufträge sind annähernd immer die Ausführung einer gesetzlichen Bestimmung
- die den Auftrag im professionellen Kontext definiert!
- ein Beispiel:
EB ist nicht „Anwendung einer Methode der Beratung in der EB
- sondern: die Umsetzung eines Rechtsauftrages – § 28 SGB VIII – durch eine Methode der Beratung
- diese Koppelung von § und Methode wird häufig „vergessen“

§ 19 SGB VIII

Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder

- (1) Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen [...]
- (2) Während dieser Zeit soll darauf hingewirkt werden, dass die Mutter oder der Vater eine schulische oder berufliche Ausbildung beginnt oder fortführt oder eine Berufstätigkeit aufnimmt.
- [...]

Kommentar Wiesner zu § 19 SGB VIII

- „Die Betreuung in einer gemeinsamen Wohnform für Mütter/Väter und Kinder muss aufgrund der Persönlichkeitsentwicklung der Mutter/des Vaters geboten sein („persönlichkeitsindiziertes Defizit im Bereich der Erziehungskompetenz`[...]`)“

Wiesner et. al (2015), S. 354

Kommentar Wiesner zu § 19 SGB VIII

- „Das ‚persönlichkeitsindiziertes Defizit‘ muss die Betreuung in dieser spezifischen Wohnform erforderlich machen.
- Dies schließt andere Hilfszwecke (wie z. B. die dauerhafte Aufrechterhaltung der Suchtabstinenz im **Nachgang zu der Drogentherapie**) nicht aus“

Wiesner et. al (2015), S. 354

Kommentar Wiesner zu § 19 SGB VIII

- „Die Zielsetzung der Hilfe liegt in der **auf die Erziehungsfähigkeit bezogenen Persönlichkeitsentwicklung** des allein erziehenden Elternteils.“

Wiesner et. al (2015), S. 354

Kommentar Wiesner zu § 19 SGB VIII

- „Die Hilfe muss geeignet und notwendig sein, um die Persönlichkeitsentwicklung (des Elternteils) zu fördern, setzt also ein entwicklungsfähiges Potenzial voraus,
- verlangt aber andererseits nicht, dass das Entwicklungsdefizit behoben werden kann.“

Wiesner et. al (2015), S. 354

Wissenschaft des Rechtes

StGB Straftat durch Unterlassung

Timeline – A. (Familie K.)

Wissenschaft der Pharmakologie

Periode der Zygoteileitung, der Implantation und der zweiblättrigen Keimscheibe

Gewöhnlich unempfindlich gegen Teratogene

Pränataler Tod

Gebrauchsinformation Atosil® Tropfen

Schwangerschaft und Stillzeit

Obwohl bisher keine Hinweise auf ein erhöhtes Fehlbildungsrisiko durch *Atosil Tropfen* vorliegen, sollten Sie das Präparat in der Frühschwangerschaft nur nach ausdrücklicher Anweisung des Arztes anwenden. Zum Ende der Schwangerschaft sollten Sie das Präparat wegen der Möglichkeit einer Atemstörung sowie von vorübergehenden Veränderungen im Elektroenzephalogramm (EEG) und im Verhalten des Neugeborenen ebenfalls nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden.

Bei neugeborenen Babys von Müttern, die *Atosil Tropfen* im letzten Trimenon (letzte drei Monate der Schwangerschaft) einnahmen, können folgende Symptome auftreten: Zittern, Muskelsteifheit und/oder -schwäche, Schläfrigkeit, Ruhelosigkeit, Atembeschwerden und Schwierigkeiten beim Stillen. Wenn Ihr Baby eines dieser Symptome entwickelt, sollten Sie Ihren Arzt kontaktieren.

In der Stillzeit sollten Sie das Präparat wegen der Möglichkeit einer Atemstörung sowie von vorübergehenden Veränderungen im Elektroenzephalogramm (EEG) und im Verhalten des Neugeborenen nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden.

Quelle: https://www.mediherz-shop.de/images/ecommerce/06/87/06875030_2012-08_de_o.pdf
[01.11.2018]

Patienteninformation Cipralex

Darf Cipralex während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?

Teilen Sie Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin mit, wenn Sie schwanger sind oder eine Schwangerschaft planen. Cipralex sollte, wenn nicht ausdrücklich von Ihrem Arzt bzw. von Ihrer Ärztin verordnet, während der Schwangerschaft nicht eingenommen werden.

Folgende Symptome können bei Neugeborenen, deren Mütter in den späten Stadien der Schwangerschaft Escitalopram erhalten hatten, sofort oder kurz nach der Geburt auftreten: Ess- und Schlafstörungen, Atmungsschwierigkeiten, bläuliche Haut, Krampfanfälle, Schwierigkeiten bei der Regelung der Körpertemperatur, niedriger Blutzuckerspiegel, Zittern, Überspanntheit, angespannte oder übermäßig entspannte Muskulatur, lebhafte Reflexe, Erbrechen, Reizbarkeit, Lethargie und ständiges Weinen. Falls Ihr Neugeborenes irgendeines dieser Symptome aufweist, kontaktieren Sie Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin.

Vergewissern Sie sich, dass Ihre Hebamme und/oder Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin darüber informiert ist, dass Sie Cipralex einnehmen. Durch die Anwendung von ähnlichen Arzneimitteln (SSRIs) während der Schwangerschaft kann das Risiko einer schwerwiegenden Erkrankung beim Neugeborenen erhöht sein. Es handelt sich dabei um den andauernden Bluthochdruck im Lungenkreislauf (persistierende pulmonale Hypertonie) beim Neugeborenen. Dabei atmet das Neugeborene schneller und hat ein bläuliches Aussehen. Diese Symptome beginnen gewöhnlich während der ersten 24 Stunden nach der Geburt. Wenn diese Symptome bei Ihrem Neugeborenen auftreten, sollten Sie sich sofort an Ihre Hebamme und/oder Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin wenden.

Cipralex soll während der Stillzeit nicht eingenommen werden. Ist die Einnahme des Präparates unabdingbar, soll abgestillt werden.

Es wird angenommen, dass Escitalopram in die Muttermilch übertritt.

Quelle: <https://compendium.ch/mpub/pnr/106162/html/de?Platform=Desktop> [01.11.2018]

Wissenschaft der Neurologie

Myelinisierungsstadien des Gehirns nach Paul Flechsig

Die dunklen Areale werden früh,
die hellgrauen später und
die weißen z.T. erst während der
Pubertät myelinisiert

Wissenschaft der Entwicklungspsychologie

§ 1 BGB

→ „Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt.“

Erfahrungsabhängige Synapsenbildung

Gehirnentwicklung beim Menschen

Gehirnentwicklung beim Menschen

Wissenschaft der Medizin

Pädiatrie
Kinderneurologie

- Dieses Kind hat einen schweren komplizierten Entzug erlebt
- der medizinisch nicht identifiziert wurde
- „8-Tage“ intensivmedizinische Versorgung unmittelbar nach der Geburt belegt dies
- dieses Kind war ein Hochrisikokind
- das in den Haushalt der Kindesmutter gegeben wurde
- einer medizinisch diagnostizierten schwer kranken Mutter
- diese Kinder haben schwere Symptome, so z. B. regelhaft eine Fütterstörung im Säuglings- und Kleinkindalter – d. h. sie essen kaum
- dieses Kind hat bis zum 7. Lebensjahr mit offenen Augen geschlafen – d. h. er hat versucht zu ruhen und hat dadurch auf sich aufgepasst

[Redacted]

Zentrum für Geburtshilfe, Kinder und Jugendmedizin

Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin

[Redacted]

Prof. Dr. [Redacted]
Direktor
Telefon: [Redacted]
Telefax: [Redacted]

Früh- und
Neugeborenenintensivstation (5H)
Sektion Neonatologie und pädiatrische
Intensivmedizin

Prof. Dr. [Redacted]
Leiter
[Redacted]

nachrichtlich Dr. [Redacted]

[Redacted] 2009

Entlassungsbericht - stationär

Patient: [Redacted] geboren am: [Redacted] 2009

wohnhaf:

stationär: ~~Neugeborenenstation vom 26.06.2009 bis 17.08.2009~~ Früh- und
Neugeborenenstation bis 04.09.2009

Fallnummer: [Redacted]

Diagnosen

- Eutrophes Frühgeborenes der 26+5 SSW, GG: 934 g
- Respiratorische Insuffizienz, ANS I°
- Apnoe-Bradykardie-Syndrom
- Bronchopulmonale Dysplasie
- Hyperbilirubinämie
- Obstipation

Anamnese

2. Kind einer 4.Gravida. Vorzeitige Wehentätigkeit, i.v.-Tokolyse seit 17.06.09, Blasensprung am 23.06.09, Nachweis von Ureaplasmen und S. aureus im Zervixabstrich, antibiotische Therapie der Mutter. Bei zunehmend erhöhten Entzündungswerten und Wehentätigkeit unter Tokolyse Geburt durch primäre Sectio.

Primäre Intubation bei respiratorischer Insuffizienz, und Volumengabe, A: 7/8/8, Na-pH: 7,35.

Geburtsgewicht: 934 g, Länge: 36,5 cm, KU: 24,4 cm, APGAR 7 / 8 / 8, Na-pH art. 7,35, BE -5,2 ET 27.09.2009

Untersuchungsbefund

Entlassungsuntersuchung:

Gesamteindruck rosig, vital, keine Stigmata.

Fontanelle im Niveau, Eupnoe, seitengleiches Atemgeräusch, reine Herztöne, kein Herzgeräusch, Pulse allseits palpabel. Abdomen weich, keine pathologischen Resistenzen, Genitale unauffällig.

Guter Muskeltonus, keine Seitendifferenz

Diagnosen

Eutrophes Frühgeborenes der 26+5 SSW, GG: 934 g

Respiratorische Insuffizienz, ANS I°

Apnoe-Bradykardie-Syndrom

Bronchopulmonale Dysplasie

Hyperbilirubinämie

Obstipation

Anamnese

2. Kind einer 4. Gravida. Vorzeitige Wehentätigkeit, i.v.-Tokolyse seit 17.06.09, Blasensprung am 23.06.09, Nachweis von Ureaplasmen und S. aureus im Zervixabstrich, antibiotische Therapie der Mutter. Bei zunehmend erhöhten Entzündungswerten und Wehentätigkeit unter Tokolyse Geburt durch primäre Sectio.

Primäre Intubation bei respiratorischer Insuffizienz, und Volumengabe, A: 7/8/8, Na-pH: 7,35.

Geburtsgewicht: 934 g, Länge: 36,5 cm, KU: 24,4 cm, APGAR 7 / 8 / 8, Na-pH art. 7,35, BE -5,2 ET 27.09.2009

Untersuchungsbefund

Entlassungsuntersuchung:

Gesamteindruck rosig, vital, keine Stigmata.

Fontanelle im Niveau, Eupnoe, seitengleiches Atemgeräusch, reine Herztöne, kein Herzgeräusch, Pulse allseits palpabel. Abdomen weich, keine pathologischen Resistenzen, Genitale unauffällig.

Guter Muskeltonus, keine Seitendifferenz

dr. med. [REDACTED]
fachärztin für kinder- und jugendpsychiatrie
und -psychotherapie

5. ✓

dr. med. [REDACTED]
[REDACTED]

privatärztlich

tätigkeitsschwerpunkt
nachweislich
e.
sollt
zwingend
schwierige
verhaltens
psychologische
familiäre
genetische
stipendi
selbstbest.
fortschritt.

Datum

2016/ [REDACTED]

[REDACTED] geb.: [REDACTED] 6.2009

Sehr geehrte Frau [REDACTED]
sehr geehrter Herr [REDACTED]

bankverbind.
deutsche postbank
und beziebar

wir berichten über [REDACTED] der seit dem 13.01.2016 zur ambulanten Diagnostik und
Beratung in der Praxis vorstellig ist.

Diagnosen

Konzentrationsstörung
Impulskontrollschwäche
Allgemeine Reifeentwicklungsverzögerung
Ausgeschl. Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung (ADHS, auf Symptomebene
Vollbild) [F90.0]
Emotionale Störung des Kindesalters, nicht näher bezeichnet [F93.9]
V.a. Alkoholembryopathie [Q86.0]
Enuresis nocturna (Sek.) [R32]
Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung [AVWS] [F80.20]
Dysgrammatismus [R48.8]
Sigmatismus [F80.8]
Sehstörung / visuelle Verarbeitungsstörung
Störung der Entwicklung motorischer Funktionen [F82.0]
Obstipation [K59.0]
Zahnfehlstellung [K07.3]
Z.n. Battered-child-Syndrom [T74.1] - 12/2009 von KKH ausgehend
Z.n. Frühgeborenes unter 1000g [P07.10]
kognitive Leistungsfähigkeit stark inkonsistent
V.a. Linkshändigkeit (umgeschult)

[redacted] Lehrkrankenhaus der Universität Hamburg

[redacted] 21073 Hamburg

3.

(u)

[redacted] 21075 Hamburg

Herrn
Dr. med. Martin Tiedgen
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin
Deichhausweg 2
21073 Hamburg

Fachabtl.: Kinder- und Jugendmedizin
Chefarzt: Dr. med. [redacted]
Station: Station [redacted]

Vorläufiger Entlassungsbrief

Hamburg, 12.2.2009

Sehr geehrter Herr Dr. [redacted]
wir berichten über unseren gemeinsamen Patienten [redacted] geboren am [redacted] 2009
wohnhaft in [redacted] Hamburg [redacted] der sich vom [redacted] an unserer stationären
Behandlung befindet.

- Diagnosen**
- Battered child Syndrom
 - Obstruktive Bronchitis
 - 1. Fieberkrampf
 - ZKS mit Entwicklungsverzögerung Bauchlage

Anamnese

[redacted] habe wie immer im Bett der Mutter geschlafen, am [redacted] wurde er bei [redacted] geortet, er
sonst aber unauffällig gewesen. Auch die Betreuerin, die mit dem Kind im Haus war, hat
ungewöhnliches aufgefallen. Normalerweise trinke Marek Milch, aber am [redacted] hat er
da das Kind laut weinte, ihr fiel dann ein blauer Fleck im Gesicht des Kindes auf. Sie hat
kühlen und informierte ihre Betreuerin. Diese informierte den Rettungsdienst und die Eltern. Die Mutter
sagte unaufgefordert zum Rettungsdienst sie habe ihr Kind nicht geschlagen.
[redacted] war bereits wegen pulmonaler Obstruktion im Rahmen seiner BPD bei Fröhenrichlichkeit bei uns
stationär. Die Mutter gibt an unter einer Depression zu leiden.

Aufnahmebefund

4 Monate alter Junge, stabiler AZ, vigilant, wehrig, schreit kräftig, kläffender Husten, großes Hämatom auf
der linken Gesichtshälfte, periorbitale Petechien beidseits, vermehrt auch links, strichförmige
Abdrücke/Kratzer, im Abstand zu Fingern passend, RR und TF blande, HF rein und rhythmisch, Pulmo
frei, keine Obstruktion, Abdomen weich, DG+, kleines Skrotum, Testes descendiert.
Gewicht: 5100g, Länge: 57cm, KU: 39cm, Temp.: 36,9°C.

Untersuchungen

Eine Zwischenbemerkung

- 2006 ist das Bremer Kind Kevin gestorben
- es ist an 24 Knochenbrüchen im 24. Lebensmonat gestorben
- bis zu dem Tod waren 64 Kollegen aus 24 Institutionen „mit Kevin und seiner Familie“ beschäftigt

Wissenschaft Recht

SGB VI Rehabilitationsrecht

Die DRV führt über dieses Pflegekind aus:

→ „Dieses Kind ist nicht mehr rehabilitationsfähig“

Das Sozialgericht führt aus:

- „n. d. Bestimmungen des § ... SGB VI ist dieses Kind durch umfangreiche rehabilitative Maßnahmen zu unterstützen“

[Ende Darstellung des Falles]

Eine weitere Ebene erklärt

Wissenschaft der Pharmakologie

Pharmaziegeschichte

Individuelles Leben + Eltern + Großeltern

Großeltern

Individuelles Leben + Eltern + Großeltern

1919

- 1803/1806 Entwicklung d. 1. Medik. Morphin
- 1826 Beginn großindustrielle Produktion frei verkäuflicher Medikamente
- 1832 Codein
- 1841 Haschisch in der Med.
- 1845 Barbitursäure
- 1860 Cocain
- 1874 Salicylsäure
- 1898 Heroin
- 1920 3. Opiumkonferenz
- 1932 Pervertin
- 1932 die Teratogenität von Barbituraten ist belegt
- 1939 Pervertin in Wehrmacht

1942

- 1942 Polamidon Methadon
- 1958 Contergan

1970

- Fortral 1972
- 1982 Temgesic
- 1990 Chrystal
- 1990 Subutex f.
- 2018 Subutex

Vielen Dank für
Aufmerksamkeit

Periode der Zygoteileitung, der Implantation und der zweiblättrigen Keimscheibe

Gewöhnlich unempfindlich gegen Teratogene

Pränataler Tod

Periode der Zygoteilung, der Implantation und der zweiblättrigen Keimscheibe

Gewöhnlich unempfindlich gegen Teratogene

Pränataler Tod

Periode der Zygoteilung, der Implantation und der zweiblättrigen Keimscheibe

Gewöhnlich unempfindlich gegen Teratogene

Pränataler Tod